

Tekshiriluvchi bilishi kerak bo'lgan holatlar

- Milliy salomatlik sug'urtasi xizmati tomonidan o'tkaziladigan umumiy sog'liqni saqlash sinovlari har 2 yilda (ofis ishchilardan tashqari barcha xodimlar uchun har yili) mavjud. Sog'liqni saqlash xizmatining burilish nuqtasi tekshiruvi 66 yoshdan yuqori tibbiy yordam oluvchilar uchun har 2 yilda bir marta hamda bolalar va chaqaloqlarning 4, 9, 18, 30, 42, 54 va 66 oyligida o'tkaziladi. Yuqorida ko'rsatilgan holatlar bundan mustasno bo'lmasa, qo'shimcha tibbiy ko'rik uchun sarflanadigan xarajatlar solinadi.
- So'rovnomani to'ldirishga jiddiy yondoshing, zero unda siz bergan ma'lumotlar shifokorning bemor holatiga tashxis qo'yishida va tibbiy tekshiruvda juda katta ahamiyat kasb etadi. Shu bois, so'rovnomada barcha kerakli ma'lumotlar aniq va to'liq kiritilganligiga ishonch hosil qiling.
- Saratonni aniqlash tekshiruvi ko'rikdan o'tuvchi tanlagan bir nechta tekshiruv turlari asosida amalga oshiriladi va ko'rikdan o'tuvchi tekshiruv xarajatlarining 10% qismini ko'tarishi talab etiladi. (Bachadon bo'yni saratoni skriningi o'tkazadigan shaxslar uchun bachadon bo'yni saratoni tomografiyasi va yo'g'on ichak skriningi uchun barcha xarajatlar NHIS tomonidan qoplanadi)
- Yo'g'on ichak saratoni tekshiruvlari 50 yoshdan oshganlar uchun o'tkaziladi. Bunda dastlab axlatda yashirin qonni aniqlash tekshiruvi o'tkaziladi. Agar axlatda yashirin qonni aniqlash tekshiruvi natijasi musbat bo'lsa, ya'ni, yashirin qon aniqlansagina, bemor ikkitalik kontrastlash tekshiruv usuli yoki endoskopiya orqali navbatdagi tekshiruvdan o'tishi mumkin.
- Imtiyozni uzaytirish dasturiga yozilgan odamlar yoki oxirgi besh yil ichida kolonoskopiya qildirgan odamlar saraton tekshiruvini qoldirishlari mumkin.
- Umumiy tibbiy tekshiruvlar (jumladan, og'zaki tekshiruvlar), chaqaloq va chaqaloqlarni sog'lomlashtirish bo'yicha tekshiruvlar, bachadon bo'yni saratoni va yo'g'on ichak saratonini tekshirish hamda o'tish yoshidagilarni tekshirish milliy dasturi doirasidagi davolashlar bilan bog'liq barcha xarajatlar NHIS tomonidan qoplanadi.
- 40, 50, 60 va 70 yoshli bemorlar uchun odatlar (chekish, ichish, mashqlar, ovqatlanish va semirib ketish) baholanadi. Odatlarni yaxshilash uchun retseptlarni dori-darmon tayyorlash yoki ishlatilish mumkin emas.
- Ko'rikdan oldin 8 soat davomida bo'sh oshqozonga yurmagan, kechki smenada ishlagan kishilar, xayz paytidagi ayollar ko'rikdan o'tsa noaniq natija chiqishi mumkin. Albatta bu qoyidalarga rioya qilgan holda ko'rikdan o'tishingizni so'raymiz.